

ชื่อผู้ป่วย.....HN.....เตียง.....วันที่.....

DoButamine HCL (250 mg/20 ml)		
การเตรียมยา		
ความเข้มข้น	1:1 (1000 mcg/ml)	2:1 (2000mcg/ml)
Dobutamine	20 ml (1 amp)	40 ml (2 amp)
NSS หรือ D5W	250 ml	250 ml
ผู้เตรียม	.....เวลา.....	.....เวลา.....
ผู้สอบทวน	.....เวลา.....	.....เวลา.....
<b>อัตราการบริหารยา .....</b> <b>ความคงตัว :</b> 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง (ยาจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีชมพู) <b>ข้อควรระวัง :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามผสมสารละลายต่าง เช่น Sod. bicarbonate</li> <li>- หากให้ร่วมกับ <math>\beta</math>-blocker เช่น propanolol, atenolol อาจจะทำให้ cardiac output ไม่เพิ่มตามต้องการ</li> <li>- หากให้ร่วมกับ nitroprusside ทำให้ cardiac output สูงขึ้น และ pulmonary wedge pressure ต่ำลง</li> <li>- ตรวจสอบบริเวณให้ยาบ่อยๆ ป้องกัน extravasation</li> </ul> <b>การติดตาม :</b> EKG, BP, HR, O/I ระหว่างให้ยา <b>อาการข้างเคียงที่ต้องรายงานแพทย์ทันที</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คลื่นไส้ อาเจียน, ปวดหัว, Nervousness</li> <li>- Hypertension</li> <li>- Fatigue</li> <li>- Arrhythmia</li> <li>- Tachycardia</li> <li>- ปัสสาวะ &lt; 100 ml/hr</li> </ul>		

ชื่อผู้ป่วย.....HN.....เตียง.....วันที่.....

DoButamine HCL (250 mg/20 ml)		
การเตรียมยา		
ความเข้มข้น	1:1 (1000 mcg/ml)	2:1 (2000mcg/ml)
Dobutamine	20 ml (1 amp)	40 ml (2 amp)
NSS หรือ D5W	250 ml	250 ml
ผู้เตรียม	.....เวลา.....	.....เวลา.....
ผู้สอบทวน	.....เวลา.....	.....เวลา.....
<b>อัตราการบริหารยา .....</b> <b>ความคงตัว :</b> 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง (ยาจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีชมพู) <b>ข้อควรระวัง :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามผสมสารละลายต่าง เช่น Sod. bicarbonate</li> <li>- หากให้ร่วมกับ <math>\beta</math>-blocker เช่น propanolol, atenolol อาจจะทำให้ cardiac output ไม่เพิ่มตามต้องการ</li> <li>- หากให้ร่วมกับ nitroprusside ทำให้ cardiac output สูงขึ้น และ pulmonary wedge pressure ต่ำลง</li> <li>- ตรวจสอบบริเวณให้ยาบ่อยๆ ป้องกัน extravasation</li> </ul> <b>การติดตาม :</b> EKG, BP, HR, O/I ระหว่างให้ยา <b>อาการข้างเคียงที่ต้องรายงานแพทย์ทันที</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คลื่นไส้ อาเจียน, ปวดหัว, Nervousness</li> <li>- Hypertension</li> <li>- Fatigue</li> <li>- Arrhythmia</li> <li>- Tachycardia</li> <li>- ปัสสาวะ &lt; 100 ml/hr</li> </ul>		

ชื่อผู้ป่วย.....HN.....เตียง.....วันที่.....

DoButamine HCL (250 mg/20 ml)		
การเตรียมยา		
ความเข้มข้น	1:1 (1000 mcg/ml)	2:1 (2000mcg/ml)
Dobutamine	20 ml (1 amp)	40 ml (2 amp)
NSS หรือ D5W	250 ml	250 ml
ผู้เตรียม	.....เวลา.....	.....เวลา.....
ผู้สอบทวน	.....เวลา.....	.....เวลา.....
<b>อัตราการบริหารยา .....</b> <b>ความคงตัว :</b> 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง (ยาจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีชมพู) <b>ข้อควรระวัง :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามผสมสารละลายต่าง เช่น Sod. bicarbonate</li> <li>- หากให้ร่วมกับ <math>\beta</math>-blocker เช่น propanolol, atenolol อาจจะทำให้ cardiac output ไม่เพิ่มตามต้องการ</li> <li>- หากให้ร่วมกับ nitroprusside ทำให้ cardiac output สูงขึ้น และ pulmonary wedge pressure ต่ำลง</li> <li>- ตรวจสอบบริเวณให้ยาบ่อยๆ ป้องกัน extravasation</li> </ul> <b>การติดตาม :</b> EKG, BP, HR, O/I ระหว่างให้ยา <b>อาการข้างเคียงที่ต้องรายงานแพทย์ทันที</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คลื่นไส้ อาเจียน, ปวดหัว, Nervousness</li> <li>- Hypertension</li> <li>- Fatigue</li> <li>- Arrhythmia</li> <li>- Tachycardia</li> <li>- ปัสสาวะ &lt; 100 ml/hr</li> </ul>		

ชื่อผู้ป่วย.....HN.....เตียง.....วันที่.....

DoButamine HCL (250 mg/20 ml)		
การเตรียมยา		
ความเข้มข้น	1:1 (1000 mcg/ml)	2:1 (2000mcg/ml)
Dobutamine	20 ml (1 amp)	40 ml (2 amp)
NSS หรือ D5W	250 ml	250 ml
ผู้เตรียม	.....เวลา.....	.....เวลา.....
ผู้สอบทวน	.....เวลา.....	.....เวลา.....
<b>อัตราการบริหารยา .....</b> <b>ความคงตัว :</b> 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง (ยาจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีชมพู) <b>ข้อควรระวัง :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้ามผสมสารละลายต่าง เช่น Sod. bicarbonate</li> <li>- หากให้ร่วมกับ <math>\beta</math>-blocker เช่น propanolol, atenolol อาจจะทำให้ cardiac output ไม่เพิ่มตามต้องการ</li> <li>- หากให้ร่วมกับ nitroprusside ทำให้ cardiac output สูงขึ้น และ pulmonary wedge pressure ต่ำลง</li> <li>- ตรวจสอบบริเวณให้ยาบ่อยๆ ป้องกัน extravasation</li> </ul> <b>การติดตาม :</b> EKG, BP, HR, O/I ระหว่างให้ยา <b>อาการข้างเคียงที่ต้องรายงานแพทย์ทันที</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คลื่นไส้ อาเจียน, ปวดหัว, Nervousness</li> <li>- Hypertension</li> <li>- Fatigue</li> <li>- Arrhythmia</li> <li>- Tachycardia</li> <li>- ปัสสาวะ &lt; 100 ml/hr</li> </ul>		